


VERSIJA 1.0



STUMBRA FORMAS VAINA - LĪKUMAINĪBA

Līkumainība ir stumbra vai baļķa izliece attiecībā pret tā garenasi. Līkumainība raksturīga visām koku sugām, un tā veidojas dažādu augšanas apstākļu un klimata ietekmē.


Koku līkumainību var veidot vējš, kalna nogāze, upju krasti, cita krituša koka slodze, sniega smagums, izliekšanās pret sauli, vainaga nesimetriskums, galotnes lūzums un citi ārēji faktori. Līkumainība var būt vienpusēja vai daudzpusēja.

Daži pētnieki uzskata, ka ideāli taisnu koku dabā vispār nav, jo kaut vai tāds dabisks faktors kā vējš vienmēr rada zināmu novirzi no ideāla.

Līkumainību parasti sāk uzskatīt par vainu, ja tā pārsniedz 1% lielumu, tomēr atsevišķos gadījumos var tikt noteikts arī cits pieļaujama līkumainības robežlielums.

Līkumainība tāpat kā citas stumbra formas vainas neietekmē koksnes tehniskās īpašības. Tā samazina baļķu sazāgēšanas lietderīgo iznākumu. Zāgējot līkus baļķus dēļiem var veidoties šķiedru slīpums, kas dēli padara nekvalitatīvu.

Līkumainību uzmēra kā kokmateriāla gareass lielāko izliekuma novirzi (a) no taisnas līnijas, ko attiecina pret kokmateriāla garumu (L) un izsaka procentos.



Izmantotā literatūra:
A. Ozoliņš "Praktiskā koksne"
LVM "Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības"



MEŽA KONSULTĀCIJU
PAKALPOJUMU CENTRS