



VERSIJA 1.0

STIRNA (*Capreolus capreolus*)

Stirnām ir laba dzirde. Masa 20-30 kg, kazlēna masa novembrī sasniedz 13-15 kg. Bezragu periodā āži atšķirami no kazām pēc t.s. "pindzeles". Astes apvidū balts tā saucamais spogulis. Kazlēni līdz 4 mēnešu vecumam rūsgani ar garenām dzeltenu plankumu joslām. Apdzīvo nelielus lapkoku un jauktos mežus, skrajas skujuoku audzes, kur bagātīgi sastopami sīkkrūmi, atklātas ainavas, arī kultūrainavas. Izteikts nometnieks, aktīvs visu gadu.

Dzīvo mātes ģimenēs vai nelielās grupās, vecāki āži ārpus riesta perioda arī pa vienam. Sasniedz 12 (16) gadu vecumu. Ierobežoti poligāma suga, riesta laiks jūlijā, augustā, apmēram mēnesi. Kazas vairoties spējīgas kļūst gada, āži - 3 (2) gadu vecumā. Grūsnība 270-280 dienas ar garu latento periodu dīgļu attīstībā, kas starp pārnadziemir visilgākais periods starp riestu un mazuļu piedzimšanu. Maija - jūnija sākumā piedzimst 1 (jaunām vai ļoti vecām kazām) - 2 kazlēni, kas dzīvo ar māti līdz gada vecumam. Stirna zīda savus kazlēnus līdz septembrim, kazlēna pastiprināta augšana notiek līdz novembrim.

Pirmie ragi jauniem āžiem sāk augt septembrī-oktobrī, nomet tos novembrī-decembrī (pusotra gada vecumā). Turpmāk ragi sāk augt janvārī-februārī. pārkaulošanās un noberšana notiek no aprīļa līdz maijam, ragus nomet oktobrī vai novembrī. Maksimālo attīstību ragi sasniedz 5-7 gadu vecumā. Klimatiskie un barošanās apstākļi ietekmē ragu augšanu un attīstību.



MEŽA KONSULTĀCIJU
PAKALPOJUMU CENTRS

Vairāk informācijas:
www.talmaciba.llkc.lv